

V Международная конференция

**СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ**



АСВОМЕД 2002



ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Россия, Сочи

Центральный клинический санаторий

им. Ф. Э. Дзержинского

11-15 мая 2002 года

WWW.ASVOMED.RU

ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОЦЕЛЕВОЙ СИСТЕМЫ «ДЕТЕНЗОР» В СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЕ В УСЛОВИЯХ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА

О.В. Балакирева, д.м.н., профессор

Медицинский центр «МЕДАРТ поликура» (г. Москва, РФ)

«ДЕТЕНЗОР» - это оригинальный метод щадящего вытяжения и разгрузки позвоночника, коррекции его нарушений, устранения болей, улучшения работы внутренних органов у взрослых и детей. Основа лечения методом «ДЕТЕНЗОР» - это восстановление нарушенного естественного биоритма ежедневного удлинения позвоночника путем долговременного безопасного вытяжения под действием собственного веса пациента. Создаваемое длительное вытяжение позвоночного столба происходит в условиях релаксации и в оптимальных направлениях в сочетании с правильным функциональным положением позвоночника при сохранении его физиологических изгибов. Это обеспечивается конструкцией системы, имеющей эластичные ребра.

Результаты исследований в ведущих реабилитационных клиниках России и других странах показали, что введение метода «ДЕТЕНЗОР» в комплекс лечебных мероприятий позволяет сократить сроки реабилитации в 1,5 - 2,7 раза при лечении вертеброгенного болевого синдрома различной локализации, а после оперативного вмешательства на позвоночнике (постламинэктомический синдром и др.) в 2,5 - 3,5 раза.

При наличии корешкового синдрома, грыж межпозвонковых дисков, дискогенной радикулопатии достигается в большинстве случаев полный регресс болевого синдрома, клинических проявлений неврологического дефицита с восстановлением мышечной массы пораженных конечностей и позы.

Метод «ДЕТЕНЗОР» применяется также при комплексной терапии церебрососудистых расстройств и спинального инсульта.

У пациентов со сколиозом 1-3 степени наблюдается стойкая тенденция к нормализации вертикальной оси позвоночника и протяженности и глубины лордоза и кифоза, уменьшение боковых отклонений и скручивания туловища, мышечного дисбаланса, крыловидности лопаток, перекоса таза, что подтверждено рентгенологическими исследованиями и данными компьютерно-оптической топографии. Динамические наблюдения при помощи компьютерной томографии и магнитно-ядерного резонанса демонстрируют качественную регидратацию межпозвонковых дисков, восстановление формы позвоночника

и динамику регресса межпозвонковых грыж.

«ДЕТЕНЗОР» можно повсеместно использовать в неврологических, ортопедо-травматологических, физиотерапевтических, соматических отделениях, отделениях лечебной физкультуры стационаров и поликлиник, в сочетании с массажем, рефлексотерапией, галотерапией и др., а также в центрах реабилитации и восстановительной медицины, санаториях, пансионатах и в домашних условиях. Важно применять детензор-терапию при патологическом течении беременности (при угрозе преждевременных родов в следствии гипертонуса матки) и др.

За долгие годы применения системы «ДЕТЕНЗОР» в 53 странах мира, а с 1988 года и в России более чем в 1000 медицинских учреждениях - противопоказаний не выявлено.

Средний срок годности системы «ДЕТЕНЗОР» - минимум 20 лет в больницах, а в частном пользовании - и более.

Отмечено успешное применение метода детензор-терапии в педиатрической практике, спортивной и военной медицине.

Учитывая портативность системы «ДЕТЕНЗОР», целесообразно создание мобильных лечебно-диагностических комплексов, включающих также аппаратуру функциональной компьютерной диагностики (напр. АМСАТ, Россия) и портативные физиотерапевтические приборы (типа НІVАМАТ, Германия) для оказания помощи на дому, а также тиражирование амбулаторных лечебно-реабилитационных центров семейного лечения.

Результаты применения метода детензор-терапии освещены в книге «Боли в спине - новый подход к лечению и профилактике у взрослых и детей» (А.Капустин, О.Балакирева)